




XIX ENFRUTE
ENCONTRO NACIONAL
SOBRE FRUTICULTURA
DE CLIMA TEMPERADO

28.29.30 JULHO 2026 PARQUE DA MAÇÃ - FRAIBURGO/SC



3º SEMINÁRIO
CATARINENSE DE OLERICULTURA

III SEMCO



Potencial agrônômico e qualitativo de variedades tintas húngaras resistentes a doenças no meio Oeste Catarinense

Keila Garcia Aloy¹, Michele Barbosa Teixeira Loss¹, Camilla Castellar², Valdecir Perazzoli², André Kulkamp de Souza², Alberto Fontanella Brighenti¹.

¹Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), ²Estação Experimental da Epagri de Videira.
keilaaloy@hotmail.com

INTRODUÇÃO



Objetivo: avaliar os aspectos fenológicos, produtivos e qualitativos das variedades húngaras Pinot Regina e Pamerzs, quando cultivadas sob as condições edafoclimáticas do meio-oeste catarinense.

METODOLOGIA

- Avaliações em três safras: 2024, 2025 e 2026.
- Variedades analisadas: uvas tintas do grupo PIWI, desenvolvidas por cruzamentos realizados na Hungria pelo Instituto de Investigação de Viticultura e Enologia da Universidade de Pécs, por meio da piramidação de genes de resistência.
- Vinhedo experimental: Videira, SC (27°01'S; 51°08'W; altitude de 840 m). O porta-enxerto adotado foi Paulsen 1103, com espaçamento de 1,2 m entre plantas e 3,0 m entre fileiras, sob sistema de condução em espaldeira.
- A variedade PIWI branca Calardis Blanc foi utilizada como testemunha para comparativos dos parâmetros agrônômicos.
- Fenologia: escala fenológica de Baillod & Baggiolini. Parâmetros produtivos: produção por planta, número de cachos por planta e massa média de cachos.
- Qualidade das uvas: sólidos solúveis (°Brix), acidez total e pH.
- Doenças fúngicas: Severidade de míldio, antracnose e podridões: *Botrytis cinerea*, podridão da uva madura (*Colletotrichum sp.*) e podridão ácida.

RESULTADOS

Tabela 1 - Desempenho agrônômico de variedades tintas resistentes a doenças no Meio Oeste Catarinense.

	Pamerzs	Pinot Regina	Calardis Blanc
Fenologia			
Brotação	20/09	21/09	18/09
Floração	26/10	27/10	12/10
Mudança de cor	06/01	06/01	01/01
Colheita	09/02	07/02	22/01
Ciclo total (Dias)	142	139	132
Severidade Doenças fúngicas			
Míldio	2,2	2,46	24
Antracnose	1,02	0,39	1,39
<i>Botrytis cinerea</i>	0,17	0,10	0,37
Podridão da uva madura	8,68	3,38	1,94
Podridão ácida	0,95	0,89	0,05
Produção			
Produção/ Planta (kg)	2,9	3,5	
Cachos/ Planta	31,09	28,36	
Massa de cachos (g)	126	154,3	
Qualidade da uva			
Sólidos Solúveis (°Brix)	20,3	19,5	
Acidez Total (mEq L ⁻¹)	83,2	73,4	
pH	3,41	3,47	



Figura 1 - Variedades PIWI Húngaras Pamerzs (esquerda) e Pinot Regina (direita) em Videira, SC.

CONCLUSÃO

Essas variedades apresentam desempenho positivo nas condições edafoclimáticas locais com potencial de cultivo e considerável resistência às doenças, principalmente no que se refere a uvas para elaboração de vinhos tintos leves, *a priori*.

PROMOÇÃO



APOIO



www.enfrute.com