



XIX ENFRUTE
ENCONTRO NACIONAL
SOBRE FRUTICULTURA
DE CLIMA TEMPERADO

28.29.30 JULHO 2026 PARQUE DA MAÇÃ - FRAIBURGO/SC



3º SEMINÁRIO
CATARINENSE DE OLERICULTURA

III SEMCO



NEP L
NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA EM OLERICULTURA
UFSM



1960

PRODUTIVIDADE DE GENÓTIPOS DE ABOBRINHA ITALIANA EM DIFERENTES ÉPOCAS DE SEMEADURA EM CLIMA SUBTROPICAL

Natiéli Wollmann Schutz¹ (IC); Lilian Osmari Uhlmann¹(O); Eduarda Loss¹ (IC); Abiel Godoy Mariano¹ (PG); Bruna Regina Carvalho Pinto¹ (PG); Luise Victória Agnes¹ (IC)

¹Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), natieli.schutz@acad.ufsm.br;

INTRODUÇÃO

- Abobrinha italiana (*Cucurbita pepo*);
- Família Cucurbitaceae;
- Grande importância econômica na olericultura brasileira;
- São limitadas as informações sobre a produtividade em diferentes épocas de cultivo;
- Essa informação é essencial para o planejamento agrícola em regiões subtropicais.

OBJETIVO

Caracterizar a produtividade da cultura para três genótipos de abobrinha italiana em diferentes épocas de semeadura.

METODOLOGIA

- **Local do Experimento:** Setor de Olericultura da UFSM, em Santa Maria (RS);
- **Período:** Julho/2024 a Junho/2025;
- **Genótipos avaliados:** 'Anita', 'Alícia' (híbridos) e 'Caserta' (cultivar);
- **Delineamento:** Blocos ao acaso, 4 repetições;
- **Avaliação:** Foram avaliadas seis plantas por parcela, com colheitas realizadas duas vezes por semana, considerando frutos em ponto comercial.
- **Análise estatística:** ANOVA com auxílio do programa estatístico SISVAR em esquema bifatorial (épocas x cultivares);



Fonte: SCHUTZ,
2025.

RESULTADOS




Figura 1- Produtividade (kg ha^{-1}) dos genótipos de abobrinha italiana Anita, Alicia e Caserta em diferentes épocas de semeadura. As barras representam a média de produtividade e as linhas verticais o erro padrão da média. Letras maiúsculas comparam genótipos na mesma época e minúsculas comparam épocas no mesmo genótipo (Scott-Knott, $p \leq 0,05$).

CONCLUSÃO

A produtividade da abobrinha italiana foi influenciada pela época de semeadura e pelo genótipo avaliado. A quarta época de semeadura (final de Outubro) proporcionou os maiores rendimentos para todos os genótipos, com destaque para o híbrido Alícia. A janela de cultivo entre o final de Julho e o final de Novembro mostrou-se a mais adequada para as condições subtropicais de Santa Maria, RS, enquanto as semeaduras realizadas entre Março e Maio não são recomendadas devido aos danos causados pelas geadas.

AGRADECIMENTOS

Fapergs (Proc. nº 24/2551-0000688-5) e CNPq (PIBIC/CNPq/UFSM).

PROMOÇÃO



www.enfrute.com